

INSUFFISANCE CARDIAQUE (IC) : VACCINATION CONTRE LE PNEUMOCOQUE



PRÉSERVER LA SANTÉ VOS PATIENTS

LES CHIFFRES CLÉS DE L'IC ⁽⁶⁾

750 000 enfants de moins de **5 ans** décédés dans le monde en 2019 (14%) pour cause de pneumonie. (1)

En France, le pneumocoque était responsable de plus de **130 000** pneumonie, de plus de **6 000** septicémies avant la vaccination. (2)

En France, la mortalité des infections à pneumocoques varie de **10 à 30%**. (3)

La mortalité augmente avec l'âge et la présence de facteurs de risque, notamment **l'insuffisance cardiaque**.

LE PNEUMOCOQUE ET L'IC ⁽⁶⁾

Chez les patients cardiaques, l'incidence de la pneumonie est **trois fois** plus élevée que dans la population générale. (4)

Un premier épisode de pneumonie est associé à une mortalité **quatre fois** plus élevée. (4)

Seul **3%** sont vaccinés contre le pneumocoque. (5)

Les recommandations cardiologiques sont de vacciner contre le pneumocoque **TOUS** les patients insuffisants cardiaques.

ACTUALITÉ VACCINALE

LE VACCIN VPC 20 ARRIVE EN 2024

Il couvre 20 sérotypes représentant **60% des infections à pneumocoque**.

Les recommandations **HAS 2023** pour le **VPC 20** :

- Nouveau schéma vaccinal chez l'adulte : **VPC 20 exclusivement**.
- Une réponse immunitaire plus intense et plus durable, par rapport au vaccin VPC 23.
- Une dose **unique**, pas de revaccination ultérieure.
- Les vaccins **VPC 13** et **VPP 23** ne sont plus recommandé chez l'adulte.

PLUS D'INFORMATION

HAS:



Ameli.fr:

